

Comunicato n. 06/2024 *Fiorello Terzariol* del 19/05/2024

**VITE: RICONTRI INFEZIONI DELLA PERONOSPORA.
PRIME NASCITE DELLO SCAPHOIDEUS TITANUS.
FASE FENOLOGICA DI IMMINENTE FIORITURA
con proiezione della VENDEMMIA 2024.
DECRETO DI LOTTA OBBLIGATORIA ALLA FLAVESCENZA DORATA.**

Il titolo riporta in sintesi tutto ciò che è l'evoluzione di questa seconda decade di maggio!

Sotto una valanga di pioggia dell'ultimo periodo (oltre 100 mm tra il 15 e il 16 di maggio, con 120 mm a Gorgo al Monticano solo nel giorno 16...un mese e mezzo di pioggia!!!), e contenute temperature attorno ai 15 – 17°C, inizia la fase fiorale in particolare nelle varietà precoci, con i primi vagiti dello *Scaphoideus titanus*. Puntuali, anche se ancora contenuti rispetto al "potenziale", i riscontri delle manifestazioni della **Peronospora** della vite su foglia e talvolta su grappolo, derivati dalle infezioni primarie nate con le piovosità della terza decade di aprile, e dalle secondarie alimentate con le precipitazioni della seconda e terza settimana di maggio!

Prime nascite quindi dello **Scaphoideus titanus** dall'11 maggio, rispetto al 16 maggio nel 2023 e del 14 maggio nel 2022.

L'attuale fenologia presenta, nonostante le condizioni critiche (temperature/piovosità) di questo inizio stagione, circa una decina di giorni di anticipo nella fase di inizio fioritura rispetto alla scorsa annata, con una proiezione di **inizio vendemmia 2024** per il Pinot grigio dal 20 di agosto e della Glera nella prima settimana di settembre!!!

Nella difesa **antiperonosporica** si consiglia di continuare a sfruttare al meglio le opportunità (in occasione delle poche finestre concesse dal meteo e dai terreni praticabili), date dai prodotti ad azione endoterapica **citotropica translaminare mesostemica** (con partner di contatto, preferibilmente con azione secondaria antibotritica!)*; oppure intervenendo, con sostanze ad attività **sistemica** tipo: **Metalaxil-M, Oxathiapiprolin, Cyazofamid, Fosetil di alluminio**...o **Fosfonati (potassio e disodio)***. Al persistere di condizioni avverse (piovosità continue...tra l'altro ancora previste), inframezzare tra un endoterapico e l'altro un intervento con prodotti ad azione di superficie (contatto)...anche sotto una pioggia "gestibile" (se le condizioni del terreno lo permettono, attenzione in particolare ai vigneti in pendenza), come abitualmente usano fare i frutticoltori (c'è sempre da imparare), soprattutto in questa annata.

Un consiglio: riportare nel QUADERNO DI CAMPAGNA sulle NOTE, il motivo per cui si è intervenuti con il prodotto fitosanitario. Abituarsi ad evidenziare e giustificare nei casi particolari, la necessità del trattamento!

Agli antiperonosporici che si impiegano con intervalli superiori agli 8 giorni, utilizzare **antioidici** di pari durata di protezione: **Triazoli** o **I.B.E.**, **Mefentrifluconazolo**, **Metrafenone**, **Spiroxamina**, **Pyriofenone**, **Cyflufenamide**, **Trifloxystrobin**, **Azoxystrobin**, **Fluxapyroxad**, ecc.

LOTTA alla FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE 2024

La **Reazione Veneto** con proprio **Decreto n. 35 del 8 maggio 2024** ha dettato le nuove **“Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite”**.

Tale **obbligo** comporta, in sintesi, **due trattamenti insetticidi** contro le forme giovanili dello **Scaphoideus titanus** nella Regione del Veneto, dichiarata **in eradicazione dalla Flavescenza dorata** nella **zona infestata**, in **TUTTI i VIGNETI** sia produttivi che non in produzione, e di **tre insetticidi** (mirati sulle forme giovanili a distanza di 7-12 giorni) nei vigneti a conduzione **biologica** (Reg. UE 2018/848).

Allegato al presente Bollettino il **Decreto** nella sua completezza, con tutti i riferimenti delle zone (infestate/cuscinetto) e degli obblighi (estirpi delle piante sintomatiche, ecc.) da ottemperare!



Inizio fioritura della Glera nel Coneglianese



giovane Scaphoideus titanus (foto di Riccardo Bozzon)

Attenzione ai **divieti** sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli.

Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell'utilizzo, le **etichette** dei formulati commerciali e di rispettarne le indicazioni (in particolare gli intervalli dei trattamenti e le dosi del singolo prodotto).