

Comunicato n. 07/24 di Fiorello Terzariol del 26/05/2024

## VITE: FIORITURA PER GRAN PARTE DELLE VARIETA'. ALTA L'ATTENZIONE SULLA FLAVESCENZA DORATA (seguire i Bollettini).

Niente è cambiato nell'ultimo periodo meteorologico, caratterizzato sempre da elevate e continue piovosità (quasi 300 mm di media in 15 giorni piovosi), accompagnate talvolta da grandinate e contenute temperature (attorno ai 17-18°C negli ultimi giorni)!

La fenologia sta evidenziando, in particolare in questi giorni e nonostante il persistere del maltempo, un generale riscontro della fase **fiorale** in gran parte delle varietà viticole.

In questo maggio 2024 la **difesa antiperonosporica** si è sempre accompagnata al tipico rumore degli atomizzatori con il suono delle campane domenicali, dovuto questo alle uniche occasioni di intervento senza pioggia nella giornata festiva, contro la Peronospora.

Al momento non si hanno ancora casi di esplosione della malattia...! Si consiglia di continuare "a testa bassa" nei trattamenti, e a sfruttare al meglio le opportunità date dai prodotti ad azione endoterapica **citotropica translaminare mesostemica** (con partner di contatto e ad azione secondaria antibotritica!); oppure intervenendo con sostanze ad attività **sistemica** tipo: **Metalaxil-M, Oxathiapiprolin, Cyazofamid, Fosetil di alluminio...**o **Fosfonati (potassio e disodio)**, sempre inframezzando con prodotti di superficie tra un endoterapico e l'altro, finchè persiste questo andamento perturbato, previsto anche nell'ultima settimana di maggio.

Agli antiperonosporici che si impiegano con intervalli superiori agli 8 giorni, utilizzare **antioidici** di pari durata di protezione: **Triazoli** o **I.B.E., Mefentrifluconazolo, Metrafenone, Spiroxamina, Pyriofenone, Cyflufenamide, Trifloxystrobin, Azoxystrobin, Fluxapyroxad**, ecc.

A breve saranno date le indicazioni per i primi trattamenti insetticidi (adeguati contro le forme giovanili dello **Scaphoideus titanus**). Già da ora però si raccomanda di estirpare le piante sintomatiche da **Flavescenza dorata**, il cui riscontro si evidenzia ormai quotidianamente.

Le indicazioni sugli interventi obbligatori saranno emanati dal Servizio Fitosanitario del Veneto (e riportati puntualmente dal presente bollettino), al riscontro nei nostri ambienti viticoli delle varie età dello *Scaphoideus titanus* (fondamentale il monitoraggio), in concomitanza alle diverse tipologie delle sostanze attive da applicare.

Attenzione ai **divieti** sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum viticoli.

Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell'utilizzo, le **etichette** dei formulati commerciali e di rispettarne le indicazioni.



Piena fioritura della Glera nel Coneglianese



Controllo del forte germogliamento: palizzamento



Vite grandinata il 22 maggio