

Comunicato n. 13/24 di Fiorello Terzariol del 11/07/2024

VITE: INIZIO INVAIATURA NEL PINOT NERO E PINOT GRIGIO. FREQUENTI I FENOMENI DI APOPLESSIA E NATURALMENTE SEMPRE ALTA L'ATTENZIONE NEI CONFRONTI DELLA FLAVESCENZA DORATA.

Dopo le piovosità che hanno interessato la prima settimana di luglio, il meteo si è caratterizzato per un notevole innalzamento termico in questo inizio della seconda settimana del mese, con temperature attorno ai 28 - 30°C di media e massime anche di 34 – 35°C, abbinate ad elevate umidità (quasi sempre sopra il 70%).

La **fenologia** evidenzia fasi che presentano grappoli in chiusura, con un timido inizio di invaiatura nel Pinot nero e ancora occasionale nel Pinot grigio.

Sempre maggiori i riscontri della **Peronospora** nelle ultime foglie e nelle femminelle, con presenza della larvata in particolare nei vigneti a conduzione biologica, ma marginalmente (e speriamo “che tenga”) nei vigneti a difesa convenzionale.

Vista la situazione sopradescritta, si consiglia di continuare ancora con gli interventi antiperonosporici a base di sostanze **Cerodinamiche**, o con **Rameici** “aiutati” dal **Cymoxanil**, o abbinati, in particolare per i biologici, all'**Olio essenziale di arancio dolce** (con attività anche antioidica, in questo caso ridurre lo Zolfo; ricordando però che tale sostanza è registrata anche come insetticida e quindi diventa necessario lo sfalcio prima dell'utilizzo!).

Attenzione a ripristinare quanto prima il prodotto Rameico (cambiando prodotto commerciale...), in occasione di **grandinate** o **forti piovosità**.

Con eventuali focolai di **Oidio** intervenire immediatamente con lo **Zolfo in polvere**.

In assenza del fungo e a carattere preventivo, impiegare lo **Zolfo micronizzato** a dosi massime da etichetta.

Contro la **Botrite**, soprattutto per le varietà a grappolo compatto, nella prossima fase di **invaiatura** e dopo i necessari interventi sulla vegetazione per esporre al meglio i grappoli, si consiglia di impiegare un **antibotritico specifico** preferibilmente di origine biologica (come indicato nelle linee tecniche della Regione del Veneto). Questo perché si evitano residui nel vino e si ottiene anche un miglior controllo del marciume acido.

Puntuale esplosione del **Mal dell'esca** e delle forme di **apoplezia** (repentino disseccamento delle piante) derivate dal particolare andamento meteo vegetativo dell'annata. Gli interventi effettuati contro lo *Scaphoideus titanus* hanno azione insetticida anche contro le **Cocciniglie**. Valutare comunque attentamente l'eventuale necessità di una strategia di contenimento nel caso di incremento delle popolazioni e dopo aver valutato bene la specie presente!

Terminate le "finestre" indicate per i trattamenti insetticidi obbligatori (convenzionale e bio) contro lo *Scaphoideus titanus* vettore della **Flavescenza dorata** della vite. Eventuali ulteriori interventi (con Piretroidi), saranno dettati solamente sulla base dei riscontri dell'insetto tramite le catture nelle trappole cromotropiche gialle presenti nella propria azienda.

Si raccomanda di **estirpare** immediatamente le piante che presentano sintomi riconducibili alla FD!!!

Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli e alle limitazioni imposte agli aderenti al Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata.

Si ricorda:

**LOTTA OBBLIGATORIA alla FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE DGR VENETO N.35 del 08.05.2024
ANNATA 2024: STRATEGIE DI LOTTA RACCOMANDATE E SOSTANZE ATTIVE AMMESSE**

DIFESA BIOLOGICA Reg. (UE) 2018/848:

1° intervento 07 – 17 giugno: Azadiractina, Beauveria bassiana, Olio essenziale di arancio dolce, Piretrine, Sali potassici di acidi grassi, Caolino (sostanza corroborante);

2° intervento: Piretrine a **7 – 12** giorni dal primo;

3° intervento: Piretrine a **7 – 12** giorni dal secondo.

DIFESA INTEGRATA (Obbligatoria e Volontaria):

1° intervento 14 – 22 giugno: Acetamiprid, Flupyradifurone, Sulfoxaflor, Deltametrina, Esfenvalerate, Etofenprox, Lambda-cialotrina, Tau-fluvalinate.

2° intervento 24 giugno – 06 luglio (a distanza di almeno 10 giorni dal primo): **Deltametrina, Tau-fluvalinate, Esfenvalerate*, Etofenprox*, Lambda-cialotrina*.**

* (massimo 1 trattamento in alternativa tra loro).

LTDI Veneto - Certificazione **SQNPI** (Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata): considerato il perdurare dell'andamento piovoso degli ultimi mesi e della elevata pressione del fungo Peronosporico, la Regione Veneto ha autorizzato (in data 02.07.2024 protocollo n.0318597) l'incremento (oltre a quanto autorizzato in data 3 giugno 2024... di **2 tra Folpet, Ditianon, Fluazinam e 1 Cimoxanil**) di **1** ulteriore intervento con prodotti a base di **Cimoxanil**, nel rispetto delle prescrizioni di etichetta.

L'autorizzazione ha validità su tutto il territorio regionale.