

VITE: PROSEGUE LENTAMENTE L'INVAIATURA NELLE VARIETA' PRECOCI. SEMPRE MAGGIORE IL RISCONTRO DELLE MACCHIE PERONOSPORICHE SULLE FEMMINELLE E ULTIME FOGLIE, CON QUALCHE INIZIO DI LARVATA.

E' proseguito anche nella terza settimana di luglio un andamento meteorologico caratterizzato da elevate temperature, sempre superiori ai 27°C di media, con altrettante elevate condizioni dell'umidità relativa media dell'aria, stabile al 70%!

Tale andamento ha determinato un rallentamento sull'attività fisiologica della pianta, con conseguente avanzamento lento dell'**invaiaura** nelle varietà precoci (Pinot e Chardonnay).

Si cominciano a pianificare i prossimi trattamenti antiperonosporici a seconda delle cultivar, se a maturazione precoce o tardiva. Comunque, saranno ora i classici prodotti **Rameici** (**Idrossidi, Ossicloruri..**), con qualche ritocco (**Cymoxanil**, ecc.) ad accompagnare gli interventi contro la **Peronospora** (ancora molto subdola e pericolosa), in questo ultimo periodo di difesa.

Attenzione a ripristinare quanto prima il prodotto Rameico (cambiando prodotto commerciale...), in occasione di **grandinate** o **forti piovosità**, vista l'annata!

Con eventuali focolai di **Oidio** intervenire immediatamente con lo **Zolfo in polvere**.

In assenza del fungo e a carattere preventivo, impiegare lo **Zolfo micronizzato**.

Contro la **Botrite** e soprattutto per le varietà a grappolo compatto, nella fase di **invaiaura** e dopo i necessari interventi sulla vegetazione per esporre al meglio i grappoli, si consiglia di impiegare un **antibotritico specifico** preferibilmente di origine biologica.

Si conferma l'esplosione del **Mal dell'esca**; limitate le segnalazioni del **Black rot** su grappolo; attese le presenze in particolare di **Ragnetto giallo** e **rosso** (come dobbiamo attenderci dopo gli impieghi dei Piretroidi e con un andamento meteo caldo/umido) e ovviamente della **Cocciniglia**.

Per il controllo della **Flavescenza dorata** si ricorda l'obbligo di **estirpare** le piante sintomatiche e continuare nel monitoraggio degli adulti di Scaphoideus titanus (attualmente numericamente contenuti) nelle trappole cromotropiche gialle. Si evidenzia che solo ad un riscontro di tali insetti nelle trappole poste nella propria azienda, si potrà pensare ad un eventuale terzo intervento insetticida per il convenzionale (Piretroidi) e di un quarto nella conduzione biologica (Piretrine).

Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli e alle limitazioni imposte agli aderenti al SQNPI (Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata).

Sempre maggiore attenzione ai periodi di carenza dei prodotti fitosanitari da impiegare!



Peronospora su Glera (Conegliano)



Oidio su Chardonnay (Pradipozzo)



Pinot nero (Pradipozzo)



Merlot (Fontanelle e Pramaggiore)



Peronospora palese su foglia...immensa!